

維持療法

血液内科

ID

患者名

身長 cm

体重 kg

体表面積 m²

初回 ・ 継続 (前回 /)

印

印

★投与量

計算値

オンコビン	2mg/body	mg	点滴静注	30 分	Day1
メソトレキセート	25mg/m ²	mg	経口投与	分 1 食後	Day1, 8, 15, 22
ロイケリン散	60mg/m ²	mg	経口投与	分 1 眠前	Day1~28

★ 点滴スケジュール

Day 1

オンコビン+

生食 50mL

30 分

次回クール

★ 投与スケジュール・・・1クール 28 日

処方用量

オンコビン	mg	↓				
メソトレキセート	mg	↓	↓	↓	↓	
ロイケリン散	mg	-----	-----	-----	-----	-----▶
(投与日)	1	8	15	22	~	28
	/	/	/	/		/

★ 注意事項

- ・オンコビンによる Grade3 以上の末梢神経障害があれば、オンコビンを中止または減量
- ・オンコビンによるイレウスがあれば中止
- ・メソ→オンコビンの順番で投与するため、メソ注射の場合あり

[オンコビン](壊死性)

- ・生食、注射用水または5%ブドウ糖を加えて溶解する
- ・1 回量は 2.0mg/body を超えない
- ・過剰投与時にホリナート(ロイコボリン)が有効であったとの症例報告がある
- ・オンコビンによる Grade3 以上の末梢神経障害があれば、オンコビンを中止または減量
- ・しびれは投与終了後 2~8 週で軽快、上肢に強くあらわれる
- ・オンコビンによるイレウスがあれば中止