

# MTX+AraC+PSL髄注療法

計算不要のため体表面積換算省略

## 血液内科

急性白血病、骨髄異形成症候群

ID

患者名

初回 ・ 継続 (前回 / )

印

印

## ★投与量

計算値

メソトレキセート注	10~15mg/body	mg	髄注	Day1
キロサイド	20~40mg/body	mg	髄注	Day1
プレドニン	20~40mg/body	mg	髄注	Day1
注射用水		20mL	溶解用のため抽出	

## ★点滴スケジュール

Day1

メソトレキセート+  
キロサイド+  
プレドニン+  
注射用水(溶解用) 髄注

次回クール

## ★投与スケジュール...1クール 7日

処方用量

メソトレキセート注	mg	↓
キロサイド	mg	↓
プレドニン注	mg	↓
注射用水(要準備!)	20mL	↓
(投与日)		1

## ★注意事項

- ・中枢神経系白血病の予防、治療
- ・1週間に1回のみ施行
- ・注射用水も準備する
- ・併用可能レジメン 他の治療と併用することあり
- ・上記以上の増量不可
- ・髄注後3時間は、ベッド上安静、臥床
- ・体重、年齢、症状に応じてメソトレキセート、キロサイドの投与量を減量する
- ・24~36時間以内に発症する頭痛に対しては、ハイペン、バルプロ酸ナトリウム徐放錠を投与する